

Endokrinologija



Zavod za endokrinologiju
Klinika za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinički bolnički centar Zagreb

Upute za bolesnike s tumorom hipofize

Nadamo se da će Vam ova brošura pomoći u boljem razumijevanju principa nadomjesnog liječenja kortikosteroidima.

Zašto je tumore hipofize potrebno operirati ?

Hipofiza je centralna žljezda koja koordinira rad drugih žljezda u tijelu. Tumori hipofize su gotovo uvijek dobroćudni i nazivaju se adenomi. Zbog mogućeg pritiska tumora na okolno tkivo (vidni živac, živci koji reguliraju rad mišića oka, krvne žile, zdravo tkivo hipofize, drugi dijelovi mozga) veće tumore, kao i tumore koji luče pojedine hormone, potrebno je operirati. Operacija se vrši kroz nos. Određeni tip tumora hipofize (tumori koji luče prolaktin) može se liječiti lijekovima.

Kakav je postupak nakon operacije tumora hipofize?

Nakon operacije tumora hipofize, u cilju što bržeg ozdravljenja i smanjenja komplikacija, potrebno je pridržavati se određenih pravila.

Prvih deset dana nakon operacije nemojte ispuhivati nos, a nosnu šupljinu ispirite fiziološkom otopinom (u zamjenu možete koristiti kapi Sterimar). Ukoliko tijekom boravka u bolnici ili u prvih nekoliko tjedana/mjeseci nakon operacije primijetite istjecanje bistre tekućine iz nosa odmah obavijestite o tome svog endokrinologa. Ukoliko u istom periodu dođe do istovremene pojave povišene temperature i glavobolje (eventualno mučnine i povraćanja, te kočenja mišića vrata) također o tome obavijestite svog liječnika obiteljske medicine i endokrinologa.

Zbog pritiska tumora na tkivo hipofize kao i oštećenja tkiva koje nastaje tijekom operativnog zahvata može se javiti prolazna ili trajna potreba za nadomještanjem pojedinih hormona budući da ih hipofiza nije u mogućnosti stvarati u dovoljnoj količini. Stoga će Vam se odmah nakon operacije započeti nadomjesno liječenje hidrokortizonom (upute o načinu uzimanja u prilogu). Tri tjedna nakon operacije potrebno je učiniti i kontrolu hormona štitnjače (fT4 i TSH) radi procjene potrebe za terapijom hormonima štitnjače.



Kišpatičeva 12, 10 000 Zagreb
tel: 01-2376 581
fax: 01-2376 036
e-mail: endokrinologija@kbc-zagreb.hr

Kada napraviti kontrolu nakon operacije tumora hipofize?

Prva kontrola nakon operacije tumora hipofize biti će u Ambulanti za bolesti hipofize nakon otprilike mjesec dana. Na ovaj pregled molimo Vas da donesete nove nalaze hormona štitnjače (fT4 i TSH), te eventualno rezultate drugih pretraga koje Vam je preporučio endokrinolog.

Kontrolna hospitalizacija u Zavodu za endokrinologiju tijekom koje će se procijeniti uspješnost operativnog zahvata, te funkcija zdravog tkiva hipofize, biti će otprilike 3 mjeseca nakon operacije.

Kontrolnu magnetsku rezonancu hipofize potrebno je učiniti 3 mjeseca nakon operacije ukoliko Vam endokrinolog ne savjetuje drugačije (za pretragu se najbolje naručiti odmah po izlasku iz bolnice).

Kada se mogu vratiti na posao?

Nakon operacije tumora hipofize Vaša radna sposobnost nije bitno umanjena i na posao se u pravilu možete vratiti već nakon desetak dana. Ipak, u pojedinim slučajevima, zbog specifičnosti vrste posla, o terminu prekida bolovanja posavjetujte se sa svojim obiteljskim liječnikom i endokrinologom.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi Vašeg liječenja, slobodno nam se obratite.

U slučaju potrebe slobodno nas kontaktirajte na sljedeće brojeve telefona:

- **01/ 2388 274**
- **01/2388 636**
- **01/ 2376 581**